




**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

# **PLANO MUNICIPAL DE VACINAÇÃO A COVID-19 – VERSÃO II**

**FIGUEIRÓPOLIS- TO**

Junho de 2021

**IMAGENS DO 1º DIA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM FIGUEIROPOLIS-TO**





Desde o início do ano de 2020 com o surto pandêmico da covid-19 que se espalhou rapidamente, as equipes de saúde do mundo uniram forças para criar um medicamento ou vacina que fosse capaz de enfrentar esse agravo, podendo assim garantir a população um retorno a vida habitual. O processo ocorreu de maneira rápida, inicialmente comprovou-se que as medidas de distanciamento social, higienização das mãos e uso de mascarar, serviriam como barreira efetiva para diminuir as transmissões em massa desse agravo.

No Brasil atualmente até o dia 28/06/2021, há 18.448.402 casos positivos, 16.673.329 casos recuperados e um total de 514.092 óbitos. No Tocantins temos 196.708 casos positivos, 178.807 recuperados e 3.192 óbitos. Em **FIGUEIRÓPOLIS-TO** atualmente temos **707** casos positivos, **668** recuperados e **13** óbitos. No Ranking de total de casos o Brasil está na 3º posição, o Tocantins está 24º posição no ranking nacional de casos de confirmados de covid-19.

No início do ano de 2020, novos estudos apresentaram uma mutação viral, que deixou o vírus mais forte e com potencial contagioso em até 70%, no entanto em relação a letalidade não houve mudanças. Nesse mesmo período a Anvisa aprovou para uso emergencial as vacinas CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, e AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz. Iniciando assim um processo de estudo para que fosse realizada a distribuição das doses dos imunizantes, no intuito de vacinar a população brasileira, iniciando assim pelos grupos de riscos, conforme programado na tabela abaixo:

- ✚ Trabalhadores da área da saúde (incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros);
- ✚ Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população idosa (60 anos ou mais);
- ✚ Indígenas aldeados em terras demarcadas;
- ✚ Comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas;
- ✚ População em situação de rua;

- ✚ Comorbidades (Diabetes mellitus; hipertensão arterial grave - difícil controle ou com lesão de órgão alvo; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grau III);
- ✚ Trabalhadores da educação;
- ✚ Pessoas com deficiência permanente severa;
- ✚ Membros das forças de segurança e salvamento;
- ✚ Funcionários do sistema de privação de liberdade;
- ✚ Trabalhadores do transporte coletivo;
- ✚ Transportadores rodoviários de carga;
- ✚ População privada de liberdade;
- ✚ Caminhoneiros;
- ✚ Trabalhadores Industriais;
- ✚ Trabalhadores da Limpeza Urbana;
- ✚ População geral acima de 18;

O público geral acima de 18 anos até 59 anos serão vacinados de acordo com o cronograma municipal, bem como a distribuição de vacinas realizadas pelo Estado, e após o público alvo elencado pelo Plano Nacional, Estadual e Municipal terem sido vacinados.

A vacinação dos grupos prioritários ocorrerá por fase descrita abaixo, descrevemos na tabela ainda o quantitativo de pessoas residentes no município, conforme cadastro no E-SUS.

| <b>Fase</b>   | <b>Público</b>                      | <b>Quantitativo</b> |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fase 1</b> | Trabalhadores da Saúde;             | <b>62</b>           |
|               | Pessoas acima de 75 anos;           | -                   |
|               | Pessoas acima de 60 anos            | -                   |
|               | institucionalizadas;                | -                   |
|               | População indígena aldeado e povo e | -                   |

|               | comunidades ribeirinhas          |             |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Fase 2</b> | Pessoas de 60 a 64 anos          | <b>214</b>  |
|               | Pessoas de 65 a 69 anos          | <b>189</b>  |
|               | Pessoas de 70 a 74 anos          | <b>164</b>  |
|               | Pessoas de 75 a 79 anos          | <b>130</b>  |
|               | Pessoas com 80 ou mais anos      | <b>193</b>  |
| <b>Fase 3</b> | Portadores de DCNT               | <b>1145</b> |
| <b>Fase 4</b> | População geral acima de 18 anos | <b>1543</b> |

### **Orientações Técnica da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19**

O ministério da saúde lançou um informe sobre a campanha nacional de vacinação contra a covid-19 informando assim alguns dados técnicos, sendo eles;

#### **📌 Dose**

A vacina será administrada em 02 doses de 0,5 ml, com intervalo de 28 dias, conforme orientação do fabricante, por via intramuscular, preferencialmente no musculo deltoide ou vasto lateral da coxa.

A indicação de administração no vasto lateral da coxa é preferencial aos pacientes que possuem fistulas ou em casos de mulheres que retiraram a mama em decorrência do tratamento de câncer, independente do período.

#### **📌 Registro de doses**

Para o registro das doses, foi criado o programa SI-PNI, onde o coordenador de imunização ou coordenador da atenção básica deverá realizar o cadastro no SCPA solicitando acesso ao sistema SI-PNI, e após este profissional deverá realizar





o cadastro do técnico de vacina nos perfil Gestor de estabelecimento em saúde e Operador de estabelecimento em saúde – campanha.

Por meio deste sistema serão solicitadas as doses para o município e o registro de doses aplicadas.

### **Orientações Adicionais**

Será necessária uma logística de organização para a administração dos imunobiológicos, sendo eles:

Não desperdiçar doses, os frascos apresentam dose única, que deverá ser aspirada obrigatoriamente apenas no momento de aplicação no paciente, evitando assim a perda do imunobiológicos. Não será permitida a aspiração das doses e armazenamento em seringas dentro da caixa térmica.

A vacina precisa ser armazenada entre + 2C e +8 C, temperaturas abaixo de +2C podem inutilizar a vacina permanentemente, devido ao componente alumínio presente no imunobiológicos. Neste sentido é orientado que as vacinas armazenadas abaixo de +2 C que congelaram ou que a apresentação do líquido mudou de cor, deverão ser consideradas inutilizadas e devolvidas a rede de frio.

Recomenda-se que seja feita curta anamnese com o paciente para constatação acerca de alergias, histórico de Síndrome Vasovagal e possíveis sinais e sintomas de síndrome gripal e/ou síndrome febril aguda, antes da aplicação da vacina.

Será necessário observar o paciente por até 15 minutos após a administração da vacina e todos os casos de reações adversas leves ou graves deverão obrigatoriamente ser notificadas no ESUS VE pelo enfermeiro coordenador de imunização ou coordenador da atenção básica.

### **Orientações para Não Imunização**

Não deve administrar vacinas simultâneas, priorizar a vacina contra covid-19 e aguardar um período de até 14 dias para administrar as demais;



Gestantes, puérperas e Lactantes deverão tomar a vacina somente após apresentação de prescrição médica liberando a administração, assim como pacientes imunodeprimidos, doenças reumáticas imonmediadas e pacientes oncológicos;

Pacientes alérgicos a alumínio;

Pacientes que apresentaram reação a D1 (dose 1).

### **Distribuição das Vacinas pela Rede Estadual de Imunização**

No dia 18 de janeiro de 2021, o governo federal distribuiu as primeiras doses da vacina para os estados. O estado do Tocantins, recebeu as primeiras doses de vacina CoronaVac do instituto Butantan, e no mesmo dia realizou a vacinação de públicos específico, dando assim o início da distribuição e planejamento para imunização de toda a população tocantinense.

Conforme nota técnica e logística de distribuição dos imunobiológicos, será necessário a equipe municipal organizar e planejar a distribuição das doses conforme distribuído pela rede estadual assim como estratégias de educação em saúde para sensibilizar a adesão a população na campanha.

Até o dia 28/06/2021, o município de **FIGUEIROPOLIS-TO** recebeu o total de 2.532 doses de vacinas, sendo aplicadas 1.873 doses, sendo 1.302 referentes à primeira aplicação e 571 referentes à segunda dose. Neste sentido foi-se necessário um estudo detalhado afim de reorganizar os grupos, realizando um estudo dos profissionais de saúde que apresentam um maior risco contrair a covid-19.

### **Cronograma de Estratégias para Vacinação**

O município de **FIGUEIRÓPOLIS-TO**, irá desenvolver as ações estratégicas conforme cronograma abaixo:

| <b>Ação</b>   | <b>Objetivo</b>   | <b>Responsável</b> |
|---|---|--------------------|
| Início da Campanha de Vacinação contra a Covid - 19   | Imunizar a população contra a covid-19 conforme disponibilidade dos imunobiológicos                               | SEMUS              |
| Garantir a participação dos profissionais da imunização nas capacitações ofertadas pelo estado      | Garantir a atualização dos profissionais e aprimoramento na logística mediante orientações dos órgãos competentes | SEMUS              |
| Capacitar os profissionais do programa saúde da família sobre a vacinação contra a covid - 19       | Garantir o conhecimento e a sensibilização dos profissionais de saúde para orientar a população                   | SEMUS              |
| Capacitar a equipe do CAC sobre a vacinação contra a covid - 19                                     | Garantir o conhecimento e a sensibilização dos profissionais de saúde para orientar a população                   | SEMUS              |
| Reunião com os representantes da comunidade sobre a campanha de vacinação contra a covid-19         | Garantir o conhecimento e a sensibilização dos representantes para orientar a população                           | SEMUS              |
| Anuncio na comunidade em carro de som sobre a vacinação contra a covid-19                           | Sensibilizar a comunidade em geral sobre a campanha de vacina contra a covid19                                    | SEMUS              |
| Entrevista na radio sobre as estratégias para a vacinação e cuidados da população frente a pandemia | Sensibilizar a comunidade em geral sobre a campanha de vacina contra a covid19                                    | SEMUS              |
| Realizar levantamento dos pacientes acamados que serão imunizados                                   | Organizar o processo de trabalho para a vacinação em domicilio  | SEMUS              |
| Realizar o planejamento de  | Garantir que a rotina da sala de vacina   | SEMUS              |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>organização o processo de trabalho em caso de necessidade de realizar a vacinação contra a covid 19 extra muro.</p> | <p>com os imunobiológicos habituais sejam preservadas</p> |  |
|--|---|--|

### Recomendações Gerais

A vacina contra a covid-19, é uma vitória para a população mundial, e assim as equipes de saúde precisam estar fortalecidas e munidas de orientações sobre a vacinação, para que a conscientização e adesão da população a vacina seja efetiva. É importante ainda orientar a população que ainda não é o momento de relaxar com as medidas de segurança e prevenção. O enfrentamento ainda deve continuar e as orientações de educação em saúde precisam ser fortalecidas pelas equipes de saúde. Após a vacinação o trabalho de enfrentamento a Covid-19 ainda não terá finalizado, devemos continuar orientando a população sobre uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social deverá ser utilizado.

### Referências Bibliográficas

SES, Secretaria Estadual de Saúde. **Integra Saúde Tocantins**. Disponível em <<http://integra.saude.to.gov.br/covid19>> Acessado em 28 de junho de 2021.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19**. 1º ed. Brasília, 2020.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19**. Brasília, 2020.



Eulália P. dos Santos Rodrigues  
Sec. Mun. de Saúde de Figueirópolis-TO  
Decreto nº 008/2021

**EULÁLIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**